

## CAT Engelures

### CAT Engelures chez patients non connus COVID+

- 1) Rechercher signes cliniques de COVID : Fièvre, Toux, Dyspnée, Asthénie, Myalgies, Diarrhée, Nausées vomissements, Céphalées, Odynophagie, Anosmie/agueusie
- 2) Rechercher des facteurs de risque de COVID sévère : Troubles cognitifs, BPCO, Asthme, Immunodépression, ou cancer en cours de chimiothérapie, Antécédents coronariens, Insuffisance cardiaque, Obésité (IMC > 40), Diabète même équilibré, même uniquement ADO, Cirrhose à partir de Child B, Femme enceinte au 3<sup>ème</sup> trimestre de grossesse, Oxygénothérapie à domicile, Signes extrapulmonaires marqués (myalgies, diarrhées ...), Dyspnée de repos ou pour des efforts modérés, troubles de la vigilance, douleur thoracique
- 3) Classification groupe 1/2/3 cf pj
- 4) Proposition d'inclusion dans le protocole (observationnel uniquement)
- 5) Si patient d'accord pour inclusion ou si doute diagnostique, envoyer mail à [dermato.covid@chu-grenoble.fr](mailto:dermato.covid@chu-grenoble.fr)

#### A) Pas de venue sur place possible/enfant :

- Consignes de confinement : durée de **14 jours après le début des signes cutanés et la fin des éventuels signes extra cutanés.**
- Surveillance : Fiche de surveillance simple si groupe 1, contact du généraliste si groupe 2, appel du SAMU si groupe 3
- Bilan :
  - PCR COVID en ville **si facteur de risque de COVID sévère ou soignant**
  - Bilan auto immunitaire : NFS plaquette CRP ionogramme urée créatinine Facteurs anti nucléaires, anti DNA natifs, anti ECT, ANCA, C3, C4, CH50, TP TCA, recherche d'anticoagulant circulant, Anticorps anti beta2GP1, Anticorps anti phospholipides, anticorps anti cardiolipines, cryoglobuline, agglutinines froides.
  - Sérologie COVID des que disponible
  - Biopsie non systématique
- Recueil de données si possible :
  - Signature de consentement photos et recueil de données (scan/mail)
  - Photographies cliniques

- Remplissage fiche de données cliniques
- Prendre coordonnées de patients pour compléter donnée évolutives J15

- Traitement : abstention, ou DERMOVAL si douleur

## **B) Venue sur place possible adultes :**

- Consignes de confinement : durée de **14 jours après le début des signes cutanés et la fin des éventuels signes extra cutanés.**
- Surveillance : Fiche de surveillance simple si groupe 1, contact du généraliste si groupe 2, appel du SAMU si groupe 3
- Convocation Salle Gilbert Faure (prescription masque la veille par mail, à aller chercher par proche)
- Bilan :
  - PCR COVID
  - Bilan sang auto immun : Facteurs anti nucléaires, anti DNA natifs, anti ECT, ANCA, C3, C4, CH50, TP TCA, recherche d'anticoagulant circulant, Anticorps anti beta2GP1, Anticorps anti phospholipides, anticorps anti cardiolipines, cryoglobuline, agglutinines froides.
  - Bilan inflammatoire COVID : sous populations lymphocytaires, analyse HLA-DR monocytaire - COVID, complément (TH50, AP50, C3, C4, C1q), Electrophorèse des protéines du sérum , -interleukines 6 et 10, Immunoglobulines (A,G,M) HEMOGRAMME + FORMULE Protéine C réactive (CRP) (Bilan lipidique avec cholestérol HDL (contient chol+trigly+HDL et LDL chol)
  - Biopsies cutanées (histo+IF)
- Recueil de données :
  - Signature de consentement photos et recueil de données
  - Photographies cliniques
  - Remplissage fiche de données cliniques
  - Prendre coordonnées de patients pour compléter donnée évolutives J15
- Traitement : abstention, ou DERMOVAL si douleur

## **CAT Engelures chez patients connus COVID+**

- Bilan :
  - Bilan auto immun : NFS plaquette CRP ionogramme urée créatinine Facteurs anti nucléaires, anti DNA natifs, anti ECT, ANCA, C3, C4, CH50, TP TCA, recherche d'anticoagulant circulant, Anticorps anti beta2GP1, Anticorps anti phospholipides, anticorps anti cardiolipines, cryoglobuline, agglutinines froides.
  - Biopsie histologie+IF

- Recueil de données si possible :
  - Signature de consentement photos et recueil de données (mail)
  - Photographies cliniques
  - Remplissage fiche de données cliniques
  - Prendre coordonnées de patients pour compléter donnée évolutives J15
- Traitement : abstention, ou DERMOVAL si douleur